

Anmeldung PET-CT

Kostenträger PKV GKV ASV stat.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Überweisender Arzt

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Vorbereitung

Patient benötigt unbedingt einen Überweisungsschein!

Bitte Vorbefunde mitgeben
(aktuelle/relevante Bildgebung, Arztbriefe, OP-Berichte, Histologie, Tumormarker etc.)

Labor

Kreatin

TSH

Größe

Gewicht

Klinische Angaben – Fragestellung

Radiopharmakon:

F-18 FDG Ga-68 PSMA Ga-68 Dototoc

Diabetes mellitus ja nein

Metformin ja nein

Insulin ja nein

SD-Überfunktion ja nein

Kontrastmittelallergie ja nein

Datum/ Unterschrift

Indikationen GKV

- Bestimmung des Tumorstadiums von primären nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen einschließlich der Detektion von Fernmetastasen
- Charakterisierung von Lungenrundherden, Beurteilung der Dignität peripherer Lungenrundherde bei Patienten mit erhöhtem Operationsrisiko und wenn eine Diagnosestellung mittels einer invasiven Methodik nicht möglich ist
- Bestimmung des Tumorstadiums von kleinzelligen Lungenkarzinomen einschließlich der Detektion von Fernmetastasen, es sei denn, dass vor der PET-Diagnostik ein kurativer Therapieansatz nicht mehr möglich erscheint
- Nachweis eines Rezidivs (bei begründetem Verdacht) bei kleinzelligen Lungenkarzinomen, wenn die Patienten primär kurativ behandelt wurden.
- Staging-Untersuchungen beim Hodgkin-Lymphom bei Erwachsenen bei Ersterkrankung und bei rezidivierter Erkrankung. Ausgenommen hiervon ist der Einsatz der PET in der Routine-Nachsorge von Patientinnen und Patienten ohne begründeten Verdacht auf ein Rezidiv des Hodgkin-Lymphoms
- Entscheidung über die Durchführung einer Neck Dissection bei Patienten mit fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren oder mit unbekanntem Primärtumorsyndromen des Kopf-Hals-Bereichs
- Entscheidung über die Durchführung einer laryngoskopischen Biopsie beim Larynxkarzinom, wenn nach Abschluss einer kurativ intendierten Therapie der begründete Verdacht auf eine persistierende Erkrankung oder ein Rezidiv besteht
- Maligne Lymphome bei Kindern und Jugendlichen
- Initiales Staging und **Therapiekontrolle** bei aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen