

Tel +49 (0) 611 90017 2000 | Fax +49 (0) 611 9547 44 77 www.pet-ct-radiomed.de

Anmeldung PET-CT PKV GKV ASV stat. Kostenträger Vorbereitung Patient benötigt unbedingt Name, Vorname einen Überweisungsschein! Bitte Vorbefunde mitgeben Geburtsdatum (aktuelle/relevante Bildgebung, Arztbriefe, OP-Berichte, Histologie. Straße Tumormarker etc.) PLZ/Ort Labor Telefon Kreatin E-Mail TSH Überweisender Arzt Größe Strasse Gewicht PLZ/Ort Telefon Klinische Angaben – Fragestellung Indikationen GKV Bestimmung des Tumorstadiums von primären nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen einschließlich der Detektion von Fern-Charakterisierung von Lungenrundherden, Beurteilung der Dignität peripherer Lungenrundherde bei Patienten mit erhöhtem Operationsrisiko und wenn eine Diagnosestellung mittels einer invasiven Methodik nicht möglich ist Bestimmung des Tumorstadiums von kleinzelligen Lungenkarzinomen einschließlich der Detektion von Fernmetastasen, es sei denn, dass vor der PET-Diagnostik ein kurativer Therapieansatz nicht mehr möglich erscheint Nachweis eines Rezidivs (bei begründetem Verdacht) bei kleinzelligen Lungenkarzinomen, wenn die Patienten primär Radiopharmakon: kurativ behandelt wurden. Staging-Untersuchungen beim Hodgkin-Lymphom bei F-18 FDG Ga-68 PSMA **Ga-68 Dototoc** Erwachsenen bei Ersterkrankung und bei rezidivierter Erkrankung. Ausgenommen hiervon ist der Einsatz der PET in der Routine-Nachsorge von Patientinnen und Patienten ohne begründeten Verdacht auf ein Rezidiv des Hodgkin-Lymphoms Entscheidung über die Durchführung einer Neck Dissection bei Diabetes mellitus ja nein Patienten mit fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren oder mit Metformin nein ja unbekannten Primärtumorsyndromen des Kopf-Hals-Bereichs Insulin ja nein Entscheidung über die Durchführung einer laryngoskopischen SD-Überfunktion nein ia Biopsie beim Larynxkarzinom, wenn nach Abschluss einer kurativ Kontrastmittelallergie nein ja intendierten Therapie der begründete Verdacht auf eine persistierende Erkrankung oder ein Rezidiv besteht Maligne Lymphome bei Kindern und Jugendlichen Initiales Staging bei aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen

Datum/ Unterschrift